

## Bijlage 10

# Voorbeeld Beheereisen

## A15a Wintervoedselakker

### Inleiding

Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. De aanwezigheid van niet geogoste granen en zaaddragende akkerkruiden biedt voedselmogelijkheden aan zaadetende vogels als geelgors en ringmus, maar ook aan muizen. Hierdoor bieden deze terreinen ook overwinteringsmogelijkheden voor blauwe kiekendief en velduil.

### Afbakening

- De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,3 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha
- Roulatie is mogelijk binnen het bedrijf

### Beheereisen en aanvullende -voorschriften

- Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 mei tot 15 maart
- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 maart uit het door Collectief Midden Overijssel voorgeschreven wintervoedselmengsel
- In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweid
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode
- De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met een door het collectief samengesteld mengsel met een gangbare zaaidichtheid
- Na inzaai blijft het gewas staan tot 15 maart van het volgende kalenderjaar
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het protocol gebruik herbiciden welke is terug te vinden op de website van het collectief.

### Pakketten

#### A15a.14.002 Wintervoedselakker



Mooi voorbeeld van een wintervoedselakker in bloei