

Pakket 13c.14.01 Botanische weiderand langs waterloop

Doel

Het doel van een weiderand langs waterlopen binnen het leefgebied Dooradering en Categorie Water en Klimaat is verbeteren van de waterkwaliteit. Een botanische weiderand heeft het volgende positieve effect op de ecologische kwaliteit:

- Functioneert als bufferzone tegen inspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen;
- Verhoogt de biodiversiteit;
- Draagt bij aan verminderde noodzaak voor chemische bestrijding doordat kruiden meer natuurlijke vijanden aantrekken.

Instapeisen

- De beheereenheid ligt langs een waterloop (watervoerende sloot), al dan niet begeleid door schouwpaden, en is minimaal 3m en maximaal 9m breed;
- In de beheereenheid zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een representatief plot van 5 x 5 meter (25 m²) minimaal de volgende aantallen inheemse grassen en kruiden aanwezig:
 - Zandgrond: 20 soorten;
 - Klei of veen: 15 soorten.

Pakketvoorwaarden

1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan;
2. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd binnen een week na het maaien;
3. De beheereenheid mag niet worden bemest;
4. Beweidings is vanaf 15 juni tot 1 januari toegestaan;
5. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 maart tot 15 juni. In deze periode vinden geen bewerkingen plaats;
6. Doorzaaien met een inheems graskruidenmengsel is toegestaan;
7. Waterloonderhoud is toegestaan van 1 september tot 1 maart waarbij het maaisel/bagger niet op de beheereenheid gebracht mag worden;
8. U mag het grasland niet klepelen, bloten, scheuren, frezen of opnieuw inzaaien;
9. De beheereenheid mag niet bereden worden met uitzondering van eventueel onderhoud aan de aanpalende waterloop en zaai- en maaierwerkzaamheden.

Pakketvariant		Vergoeding / ha
13c.14.01	Botanische weilandrand langs waterlopen - Dooradering + Categorie Water + Categorie Klimaat	€ 1.350

Waarom is bloten en klepelen niet toegestaan?

Door percelen met beweiding niet te bloten, blijven de 'eilandjes' met langer gras behouden. Ook deze leveren een biodiversiteitswaarde doordat hier weer andere kruiden groeien en beschutting voor fauna biedt. Daarbij zorgen bloten en klepelen ervoor dat het gras zo klein wordt geslagen, dat het niet goed af te voeren is en daarmee bemesting van het perceel ontstaat.