

Pakket 15a Wintervoedselakker

Doel

Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende (akker)vogels. De kruidenrijke vegetatie trekt insecten aan, de granen bieden voedsel in winter en vroege voorjaar. Door de kruiden en het graan in de winter te laten overstaan, is ook in het winterhalfjaar schuilgelegenheid en voedsel aanwezig.

Instapeisen

- De beheereenheid is minimaal 9 meter breed;
- De beheereenheid is minimaal 0,3 hectare en maximaal 1,5 hectare groot;
- De beheereenheid moet zoveel mogelijk in de zon liggen en mag nooit alleen in de schaduw liggen van opgaande beplanting.

Pakketvoorwaarden

1. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 maart uit het door CMO voorgeschreven wintervoedselmengsel;
2. Alleen de zaadmengsels van CMO zijn toegestaan;
3. U neemt een rustperiode in acht van 1 juni tot 1 maart;
4. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
5. Rouleren van de beheereenheid is na 3 jaar toegestaan om onkruiddruk beheersbaar te houden. De aangepaste locatie kan alleen na overleg met CMO, uiterlijk vóór 1 maart, bepaald worden;
6. Bemesting met kunstmest is niet toegestaan;
7. Chemische bestrijding is jaarrond niet toegestaan.

Pakketvariant		Vergoeding / ha
15a	Wintervoedselakker – Dooradering + Open Akker + Categorie Klimaat	€ 2.255

Waarom geldt een maximum van 1,5 ha?

Veel soorten, zo ook de patrijs en de veldleeuwerik, zijn gebaat bij een mozaïekbeheer: een combinatie van verschillende maatregelen op verschillende percelen die samen zorgen voor een geschikt leefgebied. Simpel gesteld zijn drie percelen van elk 1 hectare zinvoller dan één perceel van 3 hectare.

Jaarlijks opnieuw inzaaien

Een wintervoedsel akker kan meerdere jaren op één plek liggen, maar planten met zaden zoals granen nemen snel af en vergrassing neemt toe. U zaait de wintervoedselakker dan ook jaarlijks opnieuw in.

Advies: maak gebruik van een vals zaaibed

Zorg ervoor dat u op tijd zaait, zodat het gewas tot bloei en zaadzetting kan komen. Door gebruik te maken van een vals zaaibed, vermindert u ongewenste kruiden.

Advies: roulatie met vanggewassen

Een wintervoedselakker kan in de tijd afgewisseld worden met een groenbemester of vanggewas om zo de onkruiddruk te verminderen. Dit betekent wisseling van beheerpakket of tijdelijk stoppen met het beheerpakket op het specifieke perceel. Overleg tijdig met CMO over de mogelijkheden.

Rouleren mag. Hoe bepaalt CMO of de aangepaste locatie van het perceel akkoord is?

We kijken of de nieuwe locatie nog onderdeel uitmaakt van het beheermosaïek voor akkervogels. Een soort als de patrijs heeft bijvoorbeeld een actieradius van ongeveer 500 meter. Als de gewijzigde locatie te ver van de overige beheerpercelen ligt, dan draagt de wintervoedselakker onvoldoende bij.

Anders gezegd: betreft de wijziging verplaatsing naar een aangrenzend perceel, dan zal dit zelden tot nooit een probleem zijn. Het is belangrijk dat u wijzigingen tijdig (tot uiterlijk 1 maart) doorgeeft aan CMO.

Mag ik mijn eigen graan gebruiken en die mengen met het kruidenmengsel van CMO?

CMO heeft in principe geen bezwaar tegen het gebruik van eigen graan. Voor het bestellen van de kruidenmengsels is dit wel veel omslachtiger voor CMO, zeker in kleine hoeveelheden. De mogelijkheden zijn daarmee afhankelijk van het aantal deelnemers en de benodigde hoeveelheid kruidenmengel. Als u voorkeur heeft om eigen graan te gebruiken, geef dat dan vooral zo spoedig mogelijk door aan CMO. Bij voldoende animo bestellen we een deel zonder graan. Een wintervoedselakker draagt bij aan de overleving van de overwinterende vogels. Hier draagt graan voor een belangrijk deel aan bij. Het zaadmengsel moet daarom minimaal voor 30% uit graan bestaan.